

Chirurgie de la glande sous maxillaire ou sous maxillectomie

Elle est le plus souvent effectuée en cas de colique salivaire récidivante malgré des traitements médicaux bien conduits.

Elle peut être également indiquée en cas de tumeur de la glande sous maxillaire.

Elle est réalisée sous anesthésie générale.

A partir d'une cicatrice cutanée située environ 2 à 3 cm sous le rebord de la mâchoire, on réalise l'exérèse complète de la glande en préservant le rameau mentonnier du nerf facial et le nerf grand hypoglosse, responsable de la mobilité de la moitié de la langue.

Le canal de Wharton, canal excréteur de la glande, est suturé.

La pièce opératoire est systématiquement adressée en histologie.

Le patient sort du bloc avec un drain de Redon, des points ou des agrafes et un pansement discrètement compressif.

Le drainage sera retiré le plus souvent à la 48ème heure et les points au 7ème jour.



DOCTEUR DANIEL KORCHIA CABINET À MARSEILLE

(CONSULTATIONS)

429 RUE PARADIS
13008 MARSEILLE

WWW.KORCHIA-CHIRURGIE-MARSEILLE.COM

TÉL : 04 91 32 10 10

CONTACT@KORCHIA-CHIRURGIE-MARSEILLE.FR