

La chirurgie des cornets inférieurs ou turbinectomie inférieure partielle ou turbinoplastie

Elle est indiquée lorsque l'obstruction nasale est secondaire à l'hypertrophie des cornets inférieurs et quand les différents traitements médicaux bien conduits n'ont pas été suffisamment efficaces.

Elle est réalisée le plus souvent sous anesthésie générale et consiste en une réduction définitive du volume du cornet inférieur.

Cette réduction doit toujours être limitée et partielle pour éviter la survenue d'un nez trop sec avec le risque d'une rhinite croûteuse dans les suites opératoires.

La chirurgie des cornets inférieurs doit rester exceptionnelle chez l'enfant, ce malgré la demande croissante, en particulier lors de certains traitements d'orthodontie.

Le patient opéré sort du bloc opératoire avec une mèche dans chaque narine.

Il aura parfois également une plaque en silicone si un geste au niveau de la cloison nasale est associé.

Les soins post opératoires seront essentiellement des lavages et des graissages des fosses nasales.

L'amélioration respiratoire sera effective dès la disparition des croûtes et des sécrétions dans les deux fosses nasales.

Cette amélioration sera le plus souvent définitive.



DOCTEUR DANIEL KORCHIA CABINET À MARSEILLE

(CONSULTATIONS)

429 RUE PARADIS
13008 MARSEILLE

WWW.KORCHIA-CHIRURGIE-MARSEILLE.COM

TÉL : 04 91 32 10 10

CONTACT@KORCHIA-CHIRURGIE-MARSEILLE.FR