

Tympanoplastie ou opération de fermeture d'une perforation du tympan

La fermeture d'une perforation de la membrane tympanique peut se faire à partir de plusieurs matériaux mais je privilégie le plus souvent la graisse qui représentera un excellent tuteur de cicatrisation.

Comme la graisse est de prise très facile, la chirurgie peut se faire sans décollement important, sans aucune cicatrice, en chirurgie ambulatoire et même sous anesthésie locale.

Le patient sort donc du bloc opératoire avec une petite mèche souple dans son conduit auditif, invisible de l'extérieur, mèche qui sera humidifiée avec des gouttes auriculaires pendant une semaine avant d'être retirée au cabinet.

Les consignes pour le premier mois sont simples: pas d'eau dans l'oreille et pas de mouchage nez bouché pour éviter que la pression, passant dans les oreilles, ne fasse expulser la greffe.

Un contrôle à 1 mois objectivera la parfaite prise de la greffe adipeuse, dans plus de 95 % des cas.



DOCTEUR DANIEL KORCHIA CABINET À MARSEILLE

(CONSULTATIONS)

429 RUE PARADIS
13008 MARSEILLE

WWW.KORCHIA-CHIRURGIE-MARSEILLE.COM

TÉL : 04 91 32 10 10

CONTACT@KORCHIA-CHIRURGIE-MARSEILLE.FR